

## **OSTALE SMEŠE**

### **Proizvodni program potpunih smeša za golubove i kuniće**

- **Smeša GB 14% proteina** ( potpuna smeša za ishranu golubova )
  - Smeša GB upotrebljava se u peletiranom obliku, za ishranu golubova.
- **Smeša K 16% proteina** (potpuna smeša za ishranu mladih kunića I )
  - Smeša K upotrebljava se, u peletiranom obliku, za ishranu kunića.

### **Proizvodni program potpunih smeša za laboratorijske životinje**

- **Smeša LM2 19% proteina** (potpuna smeša za ishranu laboratorijskih miševa)
  - Smeša LM2 upotrebljava se u peletiranom obliku, za ishranu laboratorijskih miševa.
- **Smeša PA 20% proteina** (potpuna smeša za ishranu laboratorijskih pacova)
  - Smeša PA upotrebljava se, u peletiranom obliku, za ishranu laboratorijskih pacova.
- **Smeša ZA 18% proteina** (potpuna smeša za ishranu laboratorijskih zamoraca)
  - Ova smeša se koristi za ishranu laboratorijskih zamoraca. Koristi se u granuliranom obliku.

### **Proizvodni program ostalih vitaminsko-mineralnih predsmeša za domaće životinje**

- **Prefoskal** ( 2%-ni vitaminsko mineralni dodatak za domaće životinje)
  - PREFOSKAL služi kao dodatak domaćim životnjama radi poboljšanja snabdevenosti organizma vitaminima, mikro i makro mineralnim elementima. Životnjama se daje po volji uz posebne hranilice, ili pomešan u hranu u sledećim dozama:
    - o konjima, velikim prezivarima: 2-4 velike kašike grlo/dan
    - o teladima, ovcama, svinjama: 1/2-1 velike kašike grlo/dan

o prasadima, jagnjadima:  
grlo/dan 1/2 velike kašike

o kunićima i živini  
1 velika kašika za 10-30 životinja

(1 velika kašika sadržava 20 g preparata)

• **Stimmun mix** - Stimulator rasta i imunog sistema domaćih životinja

• **Biomiks** (vitaminsko-proteinski dodatak stočnoj hrani)

• Stočni kvasac sadrži proteine povoljnog aminokiselinskog sastava; nepoznate faktore rasta i vitamine B kompleksa ( $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_6$ , nikotinska kiselina, holin, folna kiselina, vitamin  $B_{12}$ ... ). Biomiks sprečava avitaminoze, reguliše probavu, poboljšava apetit, antistresan efekat, bolji prirast, povećava proizvodnost.

• Dozira se mladim životnjama (pilići, prasad, telad) u količini od: 2-4 supene kašike na 1 kg telesne mase odnosno oko 2 % u hranu koju životinja jede.

• **Kanistop** (preparat za suzbijanje kanibalizma nutritivnog porekla kod svinje i živine)

• Preparat sa svojim sastavom upotpunjava svakodnevno obrok životinje i obogaćuje ga aminokiselinama, makro i mikro elementima.

• Za sprečavanje i suzbijanje kanibalizma preporučuje se primena Kanistopa u količini od 5% u suvi ili vlažni obrok. Tretiranje životinja vrši se u trajanju od 10 do 14 dana, a po potrebi i duže.